

Editorial

Estimados lectores:

Fiebre Amarilla selvática ha sido notificada en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Un total de 226 casos con 99 muertos fueron reportados a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El brote de Brasil y el de la frontera colombo - venezolana representaron el 82% de los casos.

En la región de la frontera entre Colombia y Venezuela los casos se iniciaron a finales del año 2002 en el Departamento Norte de Santander en Colombia, y en el estado Zulia, en Venezuela. Otros departamentos de Colombia y también otros estados de Venezuela (Táchira y Portuguesa) presentaron casos.

En Venezuela se registraron 34 casos, con una letalidad de 41%.

La diseminación de *Aedes aegypti* en las Américas y la ocurrencia de brotes de Fiebre Amarilla Selvática constituyen un riesgo para la reurbanización de la enfermedad, por lo cual deben implementarse programas de control vectorial y aplicar las recomendaciones de la OPS para enfermedades previsibles por vacunación.

En relación al financiamiento de la edición y distribución de la revista hemos presentado serias dificultades, no obstante, esperamos continuar recibiendo el aporte económico de las instituciones que hacen posible su publicación.

Dra. Belinda Calvo M.
Directora-Editora